

Medikamentenliste MOO

Stand: 10.07.2023

vorh.	Kiste	Gebiet	Indikation	Medikament	Menge	Detail
ja	x	Haut	anaphylaktischer Notfall, z.B. Qualle, Skorpionbiss	Jext	1x 300 mg PEN N1	Adrenalin- Autoinjektor zur einmaligen Anwendung. Jeder Jext® Injektor enthält eine Einzeldosis Adrenalin zur Behandlung eines anaphylaktischen Notfalls.
ja		Haut	Sonnenbrand, Insektenstich	Fenistil		Gegen leichten Sonnenbrand und Juckreiz bei kleinen Insektenstichen wirkt Fenistil Gel.
ja	x	Haut	Allergie, Entzündung	Prednisolon	20 x 20 mg	Kortison, verschiedene Hautentzündungen wie Ekzeme oder ein allergischer Schock, nicht auf infizierte Wunden
ja	x	Haut	Entzündung	Decoderm Tri	100 g	Pilzinfektionen, Der Wirkstoff ist ein verwandter Stoff zum Kortison. Er wirkt vor allem auf der Haut entzündungshemmend und beseitigt Juckreiz, Rötungen, Schwellungen und Pusteln.
ja	x	Haut	Haut- und Fußpilz	Mykosert	Creme 20 g	Allgemeine Behandlungsdauer: 28 Tage. Die Anwendungsdauer sollte auch nach eingetretener Beschwerdefreiheit noch 14 Tage betragen.
ja	x	Haut	kleine Abszesse	Ilon Salbe classic	Creme 25 g	grüne Zugsalbe
ja	x	Haut	kleinflächige Hauterkrankungen	Diprogenta	Creme 30 g	Infektionen, die durch Bakterien ausgelöst nicht auf offene Wunden
ja	x	Haut	nach erster Wundversorgung	Bepanthen Wundsalbe	Creme 20 g	unterstützt die natürliche Wundheilung und unterstützt die Bildung von neuem Hautgewebe
ja	x	Haut	Brandblasen	Flammazine	Creme 50 g	Verbrennungen, Verbrühungen oder leichten Säureverätzungen der Haut
vorh.	Kiste	Gebiet	Indikation	Medikament	Menge	Detail
ja	x	Magen & Darm	Sodbrennen	Esomeprazol	90 Tab. 40 mg	Sodbrennen, Magengeschwür
ja	x	Magen & Darm	Sodbrennen	Esomeprazol	90 Tab. 20 mg	Sodbrennen, Magengeschwür
ja	x	Magen & Darm	Sodbrennen	Omeprazol	28 Tab. 20 mg	Sodbrennen
ja	x	Magen & Darm	Reizdarm	Duspatal	50 Tab.	Reizdarmsymptome Verstopfung, Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen

ja	x	Magen & Darm	Reizdarm	Kijimea	28 Kapseln	Reizdarmsymptome Verstopfung, Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen
ja	x	Magen & Darm	Durchfall	Loperamid	50 x 2mg	gegen Durchfall, Loperamid-ratiopharm® akut wird angewendet zur symptomatischen Behandlung von akuten Durchfällen für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren, sofern keine ursächliche Therapie zur Verfügung steht.
ja	x	Magen & Darm	nach starkem Durchfall Dehydrierung	Saltadol	PUL N2 20 St.	Gleicht Wasser- und Elektrolyteverluste aus, Glucose Elektrolyt – Mischung
ja	x	Magen & Darm	Erbrechen, Übelkeit	MCP Stada	10 mg	gegen Übelkeit und Erbrechen, der Wirkstoff greift am so genannten Brechzentrum im Gehirn an und unterdrückt auf diese Weise Übelkeit und Brechreiz. Gleichzeitig blockiert er im Magen-Darm-Bereich die Bindungsstellen für den körpereigenen Botenstoff Dopamin. Dadurch beschleunigt er die Magenentleerung und regt die Darmbewegung an.
ja	x	Magen & Darm	Seekrankheit	Scopoderm	5 Pflaster	Seekrankheit
ja	x	Magen & Darm	Hämorrhoidenleiden	Posterian	Salbe	akutes Hämorrhoidenleiden mit Lidokain
ja	x	Magen & Darm	Verstopfung	Movicol	20 Stück	Movicol ist ein schonendes Abführmittel, das hilft, den Stuhl zu transportieren und ohne dabei den Organismus unnötig zu belasten. Das macht es zu einer sanften Alternative zu herkömmlichen Abführmitteln.
ja	x	Magen & Darm	Verstopfung	Abführkapsel SN	40 Stück	Rizinusöl
ja	x	Magen & Darm	Verstopfung	Dulcolax	40 Stück	wirkt 6-12 h später
ja	x	Magen & Darm	Verstopfung	Microlax	12 x 5 ml	Rektallösung
ja	x	Magen & Darm	Bauchkrämpfe	Buscopan	20 Stück	Entkrampft die Bauchmuskulatur. Es lindert und löst die Verkrampfungen, die deine Schmerzen auslösen. Schon innerhalb von 15 Minuten entfalten die Buscopan® Dragées ihre Wirkung und dein Bauch fühlt sich besser.
ja	x	Magen & Darm	Vergiftung	Aktivkohle	2x 30 Tab.	akute orale Vergiftungen, Durchfall
vorh.	Kiste	Gebiet	Indikation	Medikament	Menge	Detail
ja	x	Augen	Reinigung	Kochsalzlösung	2 x 500 ml	zum ersten Ausspülen

ja	x	Augen	Bindehautentzündung	Euphrasia	10 x 0,4 ml	Bindehautentzündung, Lidschwellung, tränende Augen
ja	x	Augen	Trockene Augen	Thealoz	10 ml	nimmt Martin regelmäßig wg. Linsen
ja	x	Augen	Bindehautentzündung	Augen- und Nasensalbe	2 Tuben a 5 g	geschädigte Bindehaut
ja	x	Augen	Dexa Gentamicin	Augentropfen/ Salbe	5 ml Tropfen/ 2,5 g Salbe	Entzündungen des vorderen Augenabschnittes, bei denen gleichzeitig eine durch gentamicinempfindliche Erreger verursachte Infektion vorliegt oder die Gefahr einer bakteriellen Infektion besteht und bei superinfizierten, allergischen Entzündungen des äußeren Auges.
vorh.	Kiste	Gebiet	Indikation	Medikament	Menge	Detail
ja	x	Zähne	Schmerzen	Sympal	5 Tab.	leichte bis mäßig starke Schmerzen, wie Schmerzen des Bewegungsapparates, Regelschmerzen, Zahnschmerzen, entzündungshemmed
ja	x	Zähne	WK-Entzündung	Doxycylin	20 Tab.	bak. Infektion, Wurzelkanal-Entzündung
ja	x	Zähne	lose Füllung/Krone	Cavit		
ja		Zähne	Zahnfleischentzündung	Dynexan	10 g	Mundgel
ja	x	Zähne	Mundspiegel			Etui
vorh.	Kiste	Gebiet	Indikation	Medikament	Menge	Detail
		Äußere Verletzung	Knochenbruch	Schienen		
ja	K1	Äußere Verletzung	Eiter	Betaisodona	2 Tuben a 12,5 g	Desinfektion schmutzige Wunde
ja	K1	Äußere Verletzung	Wundentzündung	Antibiotikum	3 x 15 g Salbe Infecto-Genta	Creme mit Antibiotikum zum Auftragen auf die Wunden, falls entzündet
ja	K1	Äußere Verletzung	Wundheilung	Medigel	2 Tuben a 20 g	
ja	K1	Äußere Verletzung	Wundentzündung	Antibiotikum Clindamycin	30 x Kaps. Clinda hexal 150 mg	bei entzündeten Wunden, die von außen rot und heiß werden, ACHTUNG kann Darmentzündung auslösen
ja	K2/K3	Äußere Verletzung	Wundreinigung	Kochsalzlösung	3 x 500 ml	1 x K4, 1x in K5, 1 x U1
ja	K2	Äußere Verletzung	Fixierbinde		50 St. a 8 cm x 4 m (weiss) 2 St. a 8 cm x 4m (blau) 2 St. a 8 cm x 4m (rot)	

ja	K2	Äußere Verletzung	Fixiermull		10 cm x 2 m	wasserdichte Folie zur Befestigung von Wundauflagen
ja	K2	Äußere Verletzung	Vlieskompressen		50 St. a 10 x 10 cm	
ja	K2	Äußere Verletzung	Polsterwatte		6 cm x 1,8 m	
ja	K2	Äußere Verletzung	starke Blutung	Tourniquet	1 St.	stoppt schwere Blutungen durch Abbinden
ja		Äußere Verletzung	Brandwunde	Brandtuch/Paraffingaze	20 Stück 10 x 10 cm	eignet sich zur klassischen Behandlung exsudierender (nässenden) Wunden, wie z.B.: Verbrennungen 1. und 2. Grades Risswunden und Abschürfungen
ja	K3	Äußere Verletzung	Schnittwunde	Leukostrip-Steri-Stripes	12 St. a 4 x 38 mm 9 St. a 6.4 x 76 mm	solange wie möglich drauf lassen, Haut muß trocken sein vor dem Aufbringen, abtupfen beim Verbandswechsel
ja	K3	Äußere Verletzung	Reinigung	Kochsalzlösung	500 ml	Reinigung Wunde
ja	K3	Äußere Verletzung	Desinfektion	Octenisept	250 ml	Desinfektion Wunde
ja	K3	Äußere Verletzung	Mullkompressen/binden	DracoFix	10 St. a 7,5 x 7,5 cm 20 St. a 10 x 10 cm	sterile Mullkompressen
ja	K3	Äußere Verletzung	Fingerkomresse	Mivolis	selbsthaftender Fingerverband	
ja	K3	Äußere Verletzung	Wunde	Dracopor Pflaster	5 Stück 10 x 20 cm 10 Stück 8 x 10 cm 10 Stück 5 x 7,2 cm	steriler Wundverband
ja	K3	Äußere Verletzung	Wunde	Hansapor steril	2 Stück 9 x 15 cm	Schürf- und Schnittverletzungen.
ja	K3	Äußere Verletzung	Wunde	Mivolis	5 Stück 8 x 10 cm	wasserdicht
ja	K3	Äußere Verletzung	Wunde	Pflaster Cutiplast	2 Stück 20 x 10 cm	Schürf- und Schnittverletzungen.
ja	K3	Äußere Verletzung	Wunde	Kwizda Erste Hilfe Spray	40 g	blutstillend
ja	K3	Äußere Verletzung	Wunde	braunes Hansaplast	1cm x 1 m	zur Befestigung der Binden/Verbände
ja	K3/K4	Äußere Verletzung	Wunde	weißes Tape	4 cm x 2 m	zur Befestigung der Binden/Verbände
ja	K3	Äußere Verletzung	Pinzette			schwarzes Etui
ja	K3	Äußere Verletzung	Skalpell			schwarzes Etui
ja	K3	Äußere Verletzung	Schere			schwarzes Etui
ja	K3	Äußere Verletzung	nässende Wunde	Pflaster Hydraseal	5 Stück 15 x 15 cm	Die Partikel nehmen Wundsekret auf, quellen auf und entwickeln sich zu einem Gel. Dieses Gel hält die Wunde feucht. Das Gel kann solange Wundsekret aufsaugen, bis die Hydrokolloide gesättigt sind.
ja	K4	Äußere Verletzung	kleinere Wunden	diverse Pflaster	Hansaplast 2m a 6 cm Mivolis Pflaster_Set	
ja	K4	Äußere Verletzung	Spritzen			

ja	K4	Äußere Verletzung	Kanülen			auch zum Entleeren von Nagelquetschungen
ja	K4	Äußere Verletzung	Handdesinfektion		SOS Med. Desinfektion	2-Propanol 70 %
ja	K5	Äußere Verletzung	Stumpfer Stoss	Schmerzgel	Voltaren Forte	
ja	K5	Äußere Verletzung	Fingerbruch/Stauchung	Stack'sche Schiene	Finger-Splints	
ja	Netz	Äußere Verletzung	Handgelenksstauchung	Schiene	rechte Hand	notfalls auch links verwendbar
ja	Netz	Äußere Verletzung	Fußbänderdehnung	Schiene	Air-Loc	
ja	Netz	Äußere Verletzung	Knie-Stauchung	Knie-Schoner		2x vorhanden
vorh.	Kiste	Gebiet	Indikation	Medikament	Menge	Detail
ja	x	Schmerzen	lokal / Wunde	Emla	Tube Creme N3 30 g	EMLA ist rezeptfrei in den Apotheken erhältlich als Wirkstoffkombination Lidocain plus Prilocain.
ja	x	Schmerzen	allg. Schmerzen	Tramal	Tropfen 10 ml	Tramadol ist zugelassen zur Behandlung mäßig starker bis starker Schmerzen. Der Wirkstoff sollte nie länger als unbedingt notwendig zur Schmerzbehandlung angewendet werden.
ja	x	Schmerzen	Kopfschmerzen	Novalgin	Saft N3 100 ml	Starke Schmerzen nach Verletzungen oder Koliken, Hohes Fieber, das auf andere Maßnahmen nicht anspricht, 4 x 60 Tropfen max. Dosis
ja	x	Schmerzen	Migräne	Rizatriptan	Tab. N3 18 St	Akute Behandlung der Kopfschmerzphase von Migräneanfällen mit oder ohne Aura bei Erwachsenen. Die empfohlene Einzeldosis beträgt 10 mg Rizatriptan. sollten mindestens zwei Stunden auseinander liegen. Insgesamt sollten nicht mehr als zwei Einzeldosen Rizatriptan innerhalb von 24 Stunden eingenommen werden.
ja	x	Schmerzen	Schmerzen/Fieber	Dolormin Extra	Tab 2 x 30 x 400mg	Ibuprofen
ja	x	Schmerzen	Gelenk-, Rückenschmerzen	Diclofenac + Omeprazol Myditin	6 Tab. 18 Tab.	Lendenschmerz, Schiefhals, allgemeinen Muskelschmerzen
vorh.	Kiste	Gebiet	Indikation	Medikament	Menge	Detail
ja	x	Untersuchung/ Überwachung	Herzleiden	AED		

ja	U1	Untersuchung/ Überwachung	Fieber	Thermometer		
ja	U1	Untersuchung/ Überwachung	Puls, O2-Sättigung	Pulsoximeter		
ja	U1	Untersuchung/ Überwachung	Urin	Combur		Untersuchung Urin auf Leukozyten, Nitrit, Protein, Glukose und Erythrozyten. Dadurch können z.B. Harnwegsinfekte entdeckt werden.
ja	U1	Untersuchung/ Überwachung	Blutdruckmessung			
ja	U1	Untersuchung/ Überwachung	Handschuhe			auch in K4 und K5

vorh.		Gebiet	Indikation	Medikament	Menge	Detail
ja	x	Diverses	div. bakt. Erkrankungen	Amoxicilin/Clavulansäure	N2 20 St.	Breitbandantibiotikum, wirkt gegen verschiedene Bakterien.
ja	x	Diverses	div. bakt. Erkrankungen	Ciprofloxacin AL	20 Tab.	bakterielle Infektionen durch Erreger, z.B. Atemwegsinfektionen, Harnwegsinfektionen, gastrointestinale Infektionen durch Salmonellen, durch Bakterien der Gattung Shigella oder Campylobacter verursachte Durchfallerkrankung akuter Bauchspeicheldrüsenentzündung, multiresistente Keime, bei Atemwegsinfektionen sollte Ciprofloxacin mit Vorsicht eingesetzt werden, weil es nicht ausreichend, bzw. kaum gegen die Hauptverursacher Pneumokokken wirkt.
ja	x	Diverses	nach Herzinfarkt	ASS 100	50 Tab. 100 mg	zur Blutverdünnung
ja	x	Diverses	verstopfte Nase	Nasenspray		
ja	x	Diverses	zähflüssiger Schleim	Sinupret	20 Tabl.	Zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim und bei Beschwerden der Bronchitis
ja	x	Diverses	Erkältung	Vabo-Rub		
ja	x	Diverses	Masken FFP2		15 x	
ja	x	Diverses	Med. Maske		10 x	
ja		Diverses	Endoskop-Kamera Laptop			im Navi-Tisch
ja		Diverses	Kühlpads			im Kühlschrank gelagert